

周術期に休薬が必要な薬剤一覧

	薬品名	休薬期間	分類
ア	アスピリン	7日	①
	アスファネートA81	7日	①
	アブルウェイ	3日	④
	アンジュ21,28	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
	アンブラーグ	1日	①
イ	イグザレルト	3日	①
	イコサペント酸エチル	7-10日	①
	イニシク	手術前後2日間	③
ウ	ウェールナラ	術前4週間	②
エ	エクメット	手術前後2日間	③
	エストラーナテープ	術前4週間	②
	エストラジオール	術前4週間	②
	エストリオール	術前4週間	②
	エストリール	術前4週間	②
	エパデール	7-10日	①
	エパロース	7-10日	①
	エピスタ	術前3日前～術後歩行開始まで	②
	エフィエント	10日	①
	エリキウス	3日	①
	オ	オバルモン	1日
オメガ-3脂肪酸エチル		7-10日	①
カ	カナグル	3日	④
	カナリア	3日	④
キ	キャブピリン	7日	①
ク	グリコラン	手術前後2日間	③
	クロピドグレル	7日	①
ケ	ケアロード	1日	①
コ	コンプラピン	7日	①
サ	サルボグレラート	1日	①
シ	ジェミーナ	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
	ジピリダモール	2日	①
	ジベトス	手術前後2日間	③
	ジャディアンス	3日	④
	ジュリナ	術前4週間	②
	シロスタゾール	3日	①
	シンフェーズT28	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
ス	スーグラ	3日	④
	スージャヌ	3日	④
タ	タケルダ	7日	①
チ	チクロピジン	7～10日	①
テ	ディビゲル	術前4週間	②
	デベルザ	3日	④
ト	トラディアンス	3日	④
	トラビジル	1日	①

	薬品名	休薬期間	分類
ニ	ニトギスA81	7日	①
ハ	バイアスピリン	7日	①
	バゼドキシフェン	術前3日前～術後歩行開始まで	②
	バッサミンA81	7日	①
	パナルジン	7～10日	①
	パファリンA81	7日	①
ヒ	ヒスロンH	術後1週間	②
	ビビアント	術前3日前～術後歩行開始まで	②
フ	ファボワール21,28	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
	ファモターA81	7日	①
	フォシーガ	3日	④
	フホルミン	手術前後2日間	③
	ブラザキサ※	5日	①
	ブラノバル	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
	ブラビックス	7日	①
	フリウエル	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
	フリリント	5日	①
	プレタール	3日	①
プレマリン	術前4週間	②	
	プロサイリン	1日	①
	プロレナル	1日	①
ヘ	ベラサス	1日	①
	ベラプロスト	1日	①
	ベルサンチン	2日	①
ホ	ホーリン錠、V腔用錠	術前4週間	②
マ	マーベロン21,28	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
メ	メタクト	手術前後2日間	③
	メトアナ	手術前後2日間	③
	メトグルコ	手術前後2日間	③
	メトホルミン	手術前後2日間	③
	メドロキシプロゲステロン200mg	術後1週間	②
	メノエイドコンビパッチ	術前4週間	②
ヤ	ヤーズ	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
	ヤーズフレックス	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
ラ	ラベルフィーユ21,28	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
	ラロキシフェン	術前3日前～術後歩行開始まで	②
リ	リクシアナ	2日	①
	リマプロストアルファデクス	1日	①
ル	ル・エストロジェル	術前4週間	②
	ルセフィ	3日	④
	ルナベル	術前4週間、術後2週間、産後4週間	②
ロ	ロコルナール	1日	①
	ロトリガ	7-10日	①
	ロレアス	7日	①

	薬品名	休薬期間	分類
ワ	ワーファリン	5日	①
	ワルファリンK	5日	①

※ブラザキサ（ダビガトラン）の腎機能別にみた半減期及び休薬期間

腎機能(mL/min)	半減期	休薬期間		
		高リスク	中リスク	低リスク
Ccr ≥60	14時間	4日	4日	※※
30<Ccr<60	18時間	5日	5日	

※※麻酔科と協議のうえ、決定してください

この一覧はあくまでも院内マニュアルを抜粋したものになります。
詳細についてはMyWEB(薬剤部掲示板：抗血栓治療薬情報)に掲載している
下記の資料をご参照ください。

- ①抗血栓薬・抗凝固薬の休薬期間
- ②周術期に注意が必要な経口女性ホルモン剤等一覧表
- ③手術前後に注意が必要なヒグアナイド系糖尿病薬一覧
- ④手術前後に注意が必要なSGLT2阻害薬一覧

2019年7月24日 薬剤部作成
2023年8月23日 改訂