



# 薬剂委员会结果报告

2023年12月6日 開催

➤ 薬剂マスタ登録: 12月13日予定



# 新規採用医薬品

商品名	リュープリンPRO 注射用キット 22.5mg		
成分名 メーカー	リュープロレリン酢酸塩 武田薬品工業株式会社	薬価	70,865円
効能・効果	前立腺癌 閉経前乳癌		
用法・用量	24週に1回リュープロレリン酢酸塩として22.5mg を皮下に投与 ※注射針を上にしてプランジャーロッドを押して、懸濁用液全量を粉末部に移動させて、泡立てないように注意しながら、十分に懸濁してから投与		
分類	劇薬、抗悪性腫瘍剤	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
使用成績調査 等対象品目	なし	備考	代替削除品:なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:用時調製し、懸濁後は直ちに使用すること。</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:本剤は 24 週間持続の徐放性製剤であり、24 週を超える間隔で投与すると下垂体－性腺系刺激作用により性腺ホルモン濃度が再度上昇し、臨床所見が一過性に悪化するおそれがあるので、24 週に 1 回の用法を遵守すること。</li> <li>✓ その他:なし</li> </ul>		



# 新規採用医薬品(院外採用)

商品名	ライゾデグ配合注フレックスタッチ		
成分名 メーカー	インスリン デグルデグ・インスリン アスパルト ノボ ノルディスク ファーマ株式会社	薬価	1,879円/キット
効能・効果	インスリン療法が適応となる糖尿病		
用法・用量	初期:1回4~20単位を1~2回皮下注射 維持:1日4~80単位(必要により用量を超えて使用することがある) 1日1回投与の時は、主たる食事の直前に投与し毎日一定とする。 1日2回投与の時は、朝食直前と夕食直前に投与する。		
分類	劇薬	保管条件	冷所保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
使用成績調査 等対象品目	なし	流通 備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:重度の肝機能障害患者では低血糖を起こすおそれがある</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:重度の腎機能障害患者では低血糖を起こすおそれがある</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:使用中は遮光して保管し4週間以内に使用、冷蔵庫保管(2~8°C)も可能</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li> <li>✓ その他:自己注射可能</li> </ul>		



# 新規採用医薬品(院外採用)

商品名	ルセフィODフィルム2.5mg		
成分名 メーカー	ルセオグリフロジン 大正製薬株式会社	薬価	160.80円／錠(枚)
効能・効果	2型糖尿病		
用法・用量	1日1回2.5mg を朝食前又は朝食後に経口投与 効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら 5mg 1 日 1 回に増量可能		
分類	普通薬(口腔内崩壊フィルム剤)	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
粉碎	不可 不可の場合理由:フィルム剤のため	分包	不可 不可の場合理由:フィルム剤のため
使用成績調査 等対象品目	なし	流通 備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項: 重度の肝機能障害のある患者害(Child-Pugh 分類 Class C)は臨床試験では除外されている。</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項: 重度の腎機能障害(eGFR が 15mL/min/1.73m<sup>2</sup> 以上 29mL/min/1.73m<sup>2</sup> 以下)のある患者又は透析中の末期腎不全患者 投与しないこと。本剤の効果が期待できないため。</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項: なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項: なし</li> <li>✓ その他: なし</li> </ul>		



# 新規採用医薬品(仮採用)

商品名	モイゼルト軟膏1%		
成分名 メーカー	ジファミラスト 大塚製薬株式会社	薬価	1% 1g : 152.1円 (1,521円/本)
効能・効果	アトピー性皮膚炎		
用法・用量	成人: 1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布 小児: 0.3%製剤を1日2回、適量を患部に塗布、症状に応じて、1%製剤を1日2回に増量可		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
使用成績調査 等対象品目	皮膚感染症のリスクに対して製造販売後データベース調査を実施中	備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項: なし</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項: なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項: 基剤中に微細な液滴として分散した液滴分散系軟膏であり、他剤と混合することにより液滴が合一して大きくなるため、他剤と混合不可</li> <li>✓ レセプト上の注意事項: なし</li> <li>✓ その他: 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。妊娠中の親が患児に塗布する場合は最後に手を洗えばOK</li> </ul>		

# 新規採用医薬品(仮採用)

商品名	アイラミド配合懸濁性点眼液		
成分名	ブリモニジン酒石酸塩・布林ゾラミド	薬価	460.1円/mL (2,300円/本)
メーカー	千寿製薬株式会社		
効能・効果	緑内障・高眼圧症		
用法・用量	1回1滴、1日2回点眼する		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
使用成績調査等対象品目	なし	備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:重篤な腎障害のある患者には投与しないこと。</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:単剤での治療を優先すること</li> <li>✓ その他:なし</li> </ul>		

# 新規採用医薬品(仮採用)

商品名	エイベリス点眼液0.002%			
成分名 メーカー	オミデネパグ イソプロピル 参天製薬株式会社	薬価	883.9円/mL (2,209.5円/本)	
効能・効果	緑内障、高眼圧症			
用法・用量	1回1滴、1日1回点眼する。			
分類	劇薬	保管条件	冷所保存	
製剤写真				
	本体写真		PTP・包装写真	
使用成績調査 等対象品目	なし	備考	なし	
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 肝機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 腎機能障害時の注意事項:なし</li> <li>✓ 調剤・調製に関する注意事項:添付の遮光用投薬袋に入れて2~8℃で保存</li> <li>✓ レセプト上の注意事項:なし</li> <li>✓ その他:なし</li> </ul>			

## 製造中止・回収・出荷調整等情報

医薬品名	【内容】理由	今後の対応
メンタックス外用液1%	【販売中止】 製薬会社の採算が見込めないため	ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」に切替 (検討事項にて審議)
(院外採用)イノレット30R注、ノボラ ピッド注イノレット、レベミル注イノ レット	【販売中止】 製薬会社の採算が見込めないため	過去1年間処方実績がないため当該処 方マスターを停止
ブロムフェナクNa点眼液0.1% 「日新」	【自主回収(クラスⅡ)】 安定性試験にて、承認規格を上回る 結果が確認されたため	他メーカー後発品の購入困難のため、ブ ロナック点眼液(先発品)に一時的に切 替え



# 検討事項およびその他の報告

## ① 採用医薬品の整理について(採用削除品目の検討)

削除候補医薬品の調査結果より、削除可能とされた薬剤

### 【長期間処方されていない薬剤】

		商品名 (削除候補医薬品)			商品名 (削除候補医薬品)			商品名 (削除候補医薬品)
1	内	ガバペン錠200mg	8	外	デュオトラバ配合点眼液	15	注	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」
2	内	ジピリダモール錠25mg「JG」	9	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	16	注	ノボリンN注フレックスペン
3	内	テモゾロミド錠20mg「NK」	10	外	ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニットー」	17	注	ベタフェロン皮下注用960万国単位
4	内	テモゾロミド錠100mg「NK」	11	外	パッチテストパネル(S)			
5	内	リザベンカプセル100mg	12	外	ムコフィリン吸入液20%			
6	外	エスクレ坐剤「250」	13	注	コパキソン皮下注20mgシリンジ			
7	外	カチリ「ホエイ」	14	注	コントミン筋注10mg			

【複数の同効薬採用あり(処方量が少ない方を対象)】

【複数の規格採用あり(処方量が少ない方を対象)】

【販売中止が決定している薬剤】

		商品名 (削除候補医薬品)
1	内	エバスチン錠10mg 「ケミファ」
2	内	シンバスタチン錠5mg 「武田テバ」
3	内	テモカプリル塩酸塩錠2mg「タナベ」
4	外	ザジテン点眼液0.05%
5	外	メンタックスクリーム1%

		商品名 (削除候補医薬品)
1	内	アナフラニール錠25mg
2	内	エピナスチン塩酸塩錠10mg 「VTRS」
3	内	バルトレックス顆粒50%
4	外	ネイサート坐剤
5	注	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」

		商品名 (削除候補医薬品)
1	内	イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」
2	内	d-クロルフェニラミン徐放錠6mg 「武田テバ」
3	外	インドメタシンクリーム1%「日医工」

# 検討事項およびその他の報告

## ② 院内採用品の切替について

採用中止医薬品	切替医薬品
メンタックス外用液1%	ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」
トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」