

## 化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : MA-10-1

レジメン名称 : SOX+HER

適応がん種 : 胃癌

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : PDになるまで

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

消化器外科 : 医長 中田 博

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)
1		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	Rp1 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp2 90分 ハーセプチン注射用 生理食塩液250mL ↓ Rp3 15分 デキサート注6.6mg+アロキシバイアル0.75mg 生理食塩液50mL ↓ Rp4 2時間 オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液500mL ↓ Rp5 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp6 day(1)夕食後～day(15)朝食後 S-1配合OD錠
2	*	ハーセプチン注射用 生理食塩液250mL	8mg/kg 1本	点滴静注	末梢メイン	90分	
3		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシバイアル0.75mg 生理食塩液50mL	6.6mg 1V 1本	点滴静注	末梢メイン	15分	
4	*	オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液 500mL	100mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢メイン	2時間	
5		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
6	*	S-1配合OD錠	80mg/m <sup>2</sup>	内服	経口		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	ハーセプチン注射用	8mg/kg	
4	オキサリプラチン注射液	100mg/m <sup>2</sup>	
6	S-1配合OD錠	80mg/m <sup>2</sup>	120mg/day

<特記事項>

- ①大腸がん用のSOX療法とはオキサリプラチンの投与量が異なることに注意
- ②血管痛対策としてオキサリプラチンの溶液は5%ブドウ糖液500mLに増量
- ③血管痛対策としてオキサリプラチン投与時は温罨法の実施を推奨