

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : MA-11

レジメン名称 : XELOX

適応がん種 : 胃癌

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : PDになるまで

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

消化器外科 : 医長 中田 博

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)
1		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	15分	Rp1 15分 デキサート注6.6mg アロキシバイアル0.75mg 生理食塩液50mL ↓ Rp2 2時間 オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液500mL ↓ Rp3 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp4 day(1)夕食後～day(15)朝食後 カペシタビン錠
		アロキシバイアル0.75mg	1V				
		生理食塩液50mL	1本				
2 *		オキサリプラチン注射液	130mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	2時間	
		5%ブドウ糖液 500mL	1本				
3		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
4 *		カペシタビン錠	2000mg/m ²	内服	経口		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	オキサリプラチン注射液	130mg/m ²	
4	カペシタビン錠	2000mg/m ²	

<特記事項>

- ①大腸がん用のXELOX療法とオーダー間違えに注意
- ②血管痛対策としてオキサリプラチンの溶液は5%ブドウ糖液500mLに増量
- ③血管痛対策としてオキサリプラチン投与時は温罨法の実施を推奨