

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-13

レジメン名称 : CBDCA+PTX+放射線

適応がん種 : 非小細胞肺癌

インターバル日数 : 7日

予定コース数 : 6コース

医長名 : 呼吸器内科 田村 厚久

申請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1、8、15、22、29、36)
1		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	30分	Rp1 30分 DEX注6.6mg+グラニセトロンバック +ファモチジン注20mg+ボララミン注 ↓ Rp2 1時間 パクリタキセル点滴静注 5%ブドウ糖液250mL ↓ Rp3 1時間 カルボプラチン点滴静注 生理食塩液250mL ↓ Rp4 5分 生理食塩液50mL
		グラニセトロンバック3mg	1本				
		ファモチジン注 20mg	1A				
		ボララミン注5mg	1A				
2 *		パクリタキセル点滴静注	40mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	1時間	
		5%ブドウ糖液 250mL	1本			※インラインフィルター	
3 *		カルボプラチン点滴静注	AUC2	点滴静注	末梢メイン	1時間	
		生理食塩液 250mL	1本				
4		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	パクリタキセル点滴静注	40mg/m ²	
3	カルボプラチン点滴静注	AUC2	300mg/body

<特記事項>
①パクリタキセル点滴静注による過敏症状の出現を防止するため、ボララミン注とファモチジン注の投与を行う
②パクリタキセル点滴静注はインラインフィルターを用いて投与する
③カルボプラチン点滴静注の最大投与量は300mg/bodyまでとする
④アルコールに過敏な患者は慎重投与
⑤放射線治療が終了するまで1週間毎に6コース投与