

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-5

レジメン名称 : CBDCA+PTX(一括)

適応がん種 : 非小細胞肺癌

医長名 : 呼吸器内科 田村 厚久

インターバル日数 : 21日

申請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

予定コース数 : 4~6コース

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)
1		ファモチジン注 20mg(day1)	1A	点滴静注	末梢メイン	15分	Rp1 15分 ファモチジン注20mg +ポラミン注5mg DEX16.5mg +パロノセトロンバイアル +アロカリスバイアル +生理食塩液50mL ↓ Rp2 3時間 パクリタキセル点滴静注 5%ブドウ糖液500mL ↓ Rp3 1時間 カルボプラチン点滴静注 生理食塩液250mL ↓ Rp4 5分 生理食塩液50mL
		ポラミン注5mg(day1)	1A				
		デキサート注(デキサメタゾンとして)	16.5mg				
		パロノセトロン0.75mg	1V				
		アロカリスバイアル235mg	1V				
		生理食塩液 50mL	1本				
2	*	パクリタキセル点滴静注	200mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	3時間	
		5%ブドウ糖液 500mL	1本			※インラインフィルター	
3	*	カルボプラチン点滴静注	AUC6	点滴静注	末梢メイン	1時間	
		生理食塩液 250mL	1本				
4		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	パクリタキセル点滴静注	200mg/m ²	
3	カルボプラチン点滴静注	AUC6	900mg/day

<特記事項> 最終更新:2022年10月 アロカリス導入
 ①パクリタキセル点滴静注による過敏症状の出現を防止するため、ポラミン注とファモチジン注の投与を行う
 ②パクリタキセル点滴静注はインラインフィルターを用いて投与する
 ③カルボプラチン点滴静注の最大投与量は900mg/dayまでとする
 ④アルコールに過敏な患者は慎重投与