

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-54

レジメン名称 : Pembro+CDDP+PEM(1~4コース目)

適応がん種 : 非小細胞肺癌

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : 4コースまで

医 長 名 : 呼吸器内科 田村 厚久

申請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

確認薬剤師名 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2、3)
1		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	Rp1 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp2 30分 キイトルーダ注 生理食塩液100mL ↓ Rp3 90分 生理食塩液500mL ↓ Rp4 90分 ソルデム3A 500mL ↓ Rp5 90分 アスバラK+硫酸Mg 生理食塩液500mL ↓ Rp6 15分 DEX9.9mg+パロノセトロンバイアル +アロカリスバイアル 生理食塩液50mL ↓ Rp7 10分 ペトレキセド注射用 生理食塩液100mL ↓ Rp8 2時間 シスプラチン注 生理食塩液250mL ↓ Rp9 60分 マンニトールS注300mL ↓ Rp10 90分 ソルデム3A 500mL	Rp6 90分 DEX6.6mg 生理食塩液500mL ↓ Rp10 90分 ソルデム3A 500mL
2 *		キイトルーダ注	200mg	点滴静注	末梢メイン	30分		
		生理食塩液 100mL	1本	※インラインフィルター使用				
3		生理食塩液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分		
4		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分		
5		アスバラカリウム10mEq	1A	点滴静注	末梢メイン	90分		
		硫酸マグネシウム補正液	0.4A(8mEq)					
		生理食塩液500mL						
6		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢メイン	15分		
		パロノセトロンバイアル0.75mg	1V					
		アロカリスバイアル235mg	1V					
		生理食塩液 50mL	1本					
6		デキサート注 (day2、3)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	90分		
		生理食塩液 500mL(day2、3)	1本					
7 *		ペトレキセド注射用	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢メイン	10分		
		生理食塩液100mL	1本					
8 *		シスプラチン注	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢メイン	2時間		
		生理食塩液250mL	1本					
9		マンニトールS注 300mL	1本	点滴静注	末梢メイン	60分		
10		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	キイトルーダ注	200mg	200mg
7	ペトレキセド注射用	500mg/m <sup>2</sup>	
8	シスプラチン注	75mg/m <sup>2</sup>	

<特記事項>

- ①1~4コース目のレジメンであり、5コース目以降は維持療法用のレジメンとなる。
- ②ペトレキセド使用レジメンのため、治療開始7日前よりバンビタン、フレスミンを使用する。その後バンビタンは連日内服、フレスミンは9週毎に投与する。ペトレキセド最終投与後、3週間は投与する。
- ③ペトレキセドによる皮疹が懸念される場合は、投与前日~投与翌日までの3日間デキサメタゾン錠4mg×2回/日の内服が推奨される。
- ④キイトルーダ点滴時はインラインフィルターの使用が必須