

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-56

レジメン名称 : Pembro+CBDCA+PEM(1~4コース目)

適応がん種 : 非小細胞肺癌

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : 4コース

医長名 : 呼吸器内科 田村 厚久

申請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

確認薬剤師名 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)
1		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	Rp1 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp2 30分 キイトルーダ注 生理食塩液100mL ↓ Rp3 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp4 15分 DEX6.6mg+パロノセトロンバイアル +アロカリスバイアル +生理食塩液50mL ↓ Rp5 10分 ペトレキセド注 生理食塩液100mL ↓ Rp6 1時間 カルボプラチン注 生理食塩液250mL ↓ Rp7 5分 生理食塩液50mL
2 *		キイトルーダ注 生理食塩液 100mL	200mg 1本	点滴静注 ※インラインフィルター使用	末梢メイン	30分	
3		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
4		デキサート注(デキサメタゾンとして) パロノセトロンバイアル0.75mg アロカリスバイアル235mg 生理食塩液50mL	6.6mg 1V 1V 1本	点滴静注	末梢メイン	15分	
5 *		ペトレキセド注射用 生理食塩液100mL	500mg/m ² 1本	点滴静注	末梢メイン	10分	
6 *		カルボプラチン注 生理食塩液250mL	AUC5 1本	点滴静注	末梢メイン	1時間	
7		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	キイトルーダ注	200mg	200mg
5	ペトレキセド注射用	500mg/m ²	
6	カルボプラチン注	AUC5	750mg

<特記事項>

- ① 1~4コース目のレジメンであり、5コース目以降は維持療法用のレジメンとなる。
- ② ペトレキセド使用レジメンのため、治療開始7日前よりバンビタン、フレズミンを使用する。その後バンビタンは連日内服、フレズミンは9週毎に投与する。ペトレキセド最終投与後、3週間は投与する。
- ③ ペトレキセドによる皮疹が懸念される場合は投与前日~投与翌日までの3日間デキサメタゾン錠4mg×2回/日の内服が推奨される。
- ④ カルボプラチン点滴静注の最大投与量は750mg/dayまでとする。
- ⑤ キイトルーダ点滴時はインラインフィルターの使用が必須