

テセントリク+ベバシズマブ+パクリタキセル+カルボプラチソ療法の治療をお受けになる方へ

★治療スケジュール 症状や経過に合わせて治療スケジュールが変わることがあります。

お薬の名前	1日目	2~21日目
テセントリク (アテゾリズマブ)	 初回1時間、2回目以降30分	
ベバシズマブ (ベバシズマブ)	 初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分	
吐き気止め	 15分	お休み
パクリタキセル (パクリタキセル)	 3時間	
カルボプラチソ (カルボプラチソ)	 1時間	

★起こりやすい副作用 これらの副作用が、すべての方に起こるわけではありません。

〈血液検査からわかる副作用〉



白血球減少

白血球は体内へ進入した細菌から体を守る重要な役割があり、治療開始後10~14日頃に最も少くなり、菌やウイルスに感染しやすくなります。

⇒日頃から手洗い、うがいなどの感染対策を！ 白血球が少ない時期は人ごみを避けましょう。

赤血球減少(貧血)

副作用による貧血の場合、めまい、ふらつきなどの症状としてあらわれることがあります。場合によっては、薬で治療をしたり、輸血をすることもあります。

血小板減少

血小板は出血した時に血を止める働きがあります。血小板が少なくなると、歯肉からの出血や内出血、鼻血などがおこりやすくなります。⇒血小板が少ない時期はケガには注意して下さい。

腎機能障害

抗がん剤の影響で腎臓がうまく動かなくなることがあります。腎臓の動きが悪くなると、お薬が体内から抜けにくくなり、副作用が強く出る場合があります。

⇒500mLのペットボトル、2本ぐらいを目安に水分をとりましょう。

〈ご自身でわかる副作用〉

悪心・嘔吐・食欲不振

個人差の大きい副作用です。治療時期に合った吐き気止めを使います。ただし、水分もとれない場合は病院へ連絡して下さい。[⇒食欲がなくても、水分はしっかりとるようにして下さい。](#)

脱毛

抗がん剤の種類や患者さん個人によって違いはあります。治療開始2~3週間後から抜け始めます。髪以外の部分（まゆ毛、ひげ、体毛など）でも同様におこります。治療が終了すれば、少しずつですが生えてきます。

[⇒脱毛が気になる場合は、医療用かつらやウィッグ、帽子などをお勧めします。](#)

過敏症

点滴中にアレルギー症状がおこることがあります。『息苦しい』『胸が苦しい』『心臓がドキドキする』『顔がほてる』『汗ができる』『顔や体がかゆい』などの症状がおこった時は、すぐにスタッフを呼んで下さい。[⇒アレルギー症状は、多くの場合、点滴を始めてから数分でおこります。](#)

末梢神経障害

治療を開始した直後に、手足がしびれることもある。徐々にしびれが出てくる場合もあります。治療を終えても、しびれが回復するまで時間がかかります。

[⇒日常生活に支障が出る時は、主治医に相談して下さい。](#)

出血

鼻や歯肉、膣などの粘膜から出血することがあります。10分たっても血が止まらない場合は病院へ連絡して下さい。

高血圧

〈免疫療法による副作用〉

間質性肺疾患

空気を取り込む肺胞という器官が炎症を起こす病気です。初期症状は、息切れ、発熱、痰のない乾いた咳（空咳）、疲労などがあげられます。これらの症状に気付いたら自分で対処せず、すぐに医師、看護師、薬剤師に連絡して下さい。また、60歳以上の方や肺の病気や手術をしたことがある方、呼吸機能が低下していたり酸素を投与している方、肺に放射線を照射したことがある方、腎障害のある方は間質性肺疾患が起りやすい可能性があるため特に気を付けましょう。

重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症

神経から筋肉への情報の伝達がうまくいかなくなる病気です。よく現れる症状は、繰り返し運動で疲れやすい、足や腕に力が入らない、ものが二重に見える、まぶたが重い、筋肉痛があるなどです。症状が急激に悪化し、息がしにくくなることもあります。

大腸炎、重度の下痢

下痢や、大腸に炎症が起こる大腸炎を発症することができます。初期症状は、下痢、排便回数の増加、腹痛、血便です。発熱を伴うこともあります。

[1型糖尿病・肝機能、甲状腺機能障害 ⇒血液検査で定期的に確認を行います。](#)

★すぐに連絡をいただきたい副作用

★「ふるえ」、「悪寒」、「38℃以上の発熱」、「肌のほてり」、「紅潮」（敗血症）

★「皮膚のかゆみ」、「じんま疹」、「声のかすれ」、「くしゃみ」、「のどのかゆみ」、「息苦しさ」、「心臓がドキドキする」、「意識がもうろうとする」、「熱っぽい」、「急に寒気がする」、「ふらつく」（過敏症）

※ここに記載した副作用以外にも、体の異常を感じたら病院にご連絡ください。