

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-69

レジメン名称 : Nivolumab(3週間毎)+Ipilimumab+CBDCA+PEM

適応がん種 : 非小細胞肺癌

インターバル日数 : 42日

予定コース数 : 1コースまで

医 長 名 : 呼吸器内科 田村 厚久

申請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

確認薬剤師名 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(22)
1		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分		
2 *		オブジーボ点滴静注	360mg	点滴静注	末梢メイン	30分		
		生理食塩液 100mL	1本		※インラインフィルター使用			
					※total 100mL			
3		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	30分		
4 *		ヤーボイ点滴静注	1mg/kg	点滴静注	末梢メイン	30分		
		生理食塩液 50mL	1本		※インラインフィルター使用			
					※total 50mL			
5		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分		
6		デキササート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	15分		
		パロノセトロンバイアル0.75mg	1V					
		アロカリスバイアル235mg	1V					
		生理食塩液 50mL	1本					
7 *		ペメトレキセド点滴静注	500mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	10分		
		生理食塩液 100mL	1本					
8 *		カルボプラチン点滴静注	AUC5	点滴静注	末梢メイン	1時間		
		生理食塩液 250mL	1本					
9		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	オブジーボ	360mg	360mg
4	ヤーボイ	1mg/kg	
7	ペメトレキセド注	500mg/m ²	
8	カルボプラチン注	AUC5	750mg

<特記事項>

- ①1コース目のレジメンであり、2コース目以降は維持療法用のレジメンとなる。
- ②ペメトレキセド使用レジメンのため、治療開始7日前よりバンビタン、フレズミンを使用する。その後バンビタンは連日内服、フレズミンは9週毎に投与する。ペメトレキセド最終投与後、3週間は投与する。
- ③ペメトレキセドによる皮疹が懸念される場合は、投与前日～投与翌日までの3日間デキサメタゾン錠4mg×2回/日の内服が推奨される。
- ④カルボプラチン点滴静注の最大投与量は750mg/dayまでとする。
- ⑤オブジーボ、ヤーボイ点滴時はインラインフィルターの使用が必須