

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : XELOB

レジメン名称 : XELOX+B

適応がん種 : 大腸

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : PDまで

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

消化器外科 : 医長 中田 博

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1) |
|--------|---|--------------------|-----------------------|------|-------|---------|--|
| 1 | | デキサート注(デキサメタゾンとして) | 6.6mg | 点滴静注 | 末梢メイン | 15分 | Rp1 15分 デキサート注6.6mg アロキシバイアル0.75mg 生理食塩液50mL ↓ Rp2 90分 アバステン注射液 生理食塩液100mL ↓ Rp3 2時間 オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液500mL ↓ Rp4 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp5 day(1)夕食後～day(15)朝食後 カペシタビン錠 1日2回内服 |
| | | アロキシバイアル0.75mg | 1V | | | | |
| | | 生理食塩液50mL | 1本 | | | | |
| 2 * | | アバステン点滴静注 | 7.5mg/kg | 点滴静注 | 末梢メイン | 90分 | |
| | | 生理食塩液100mL | 1本 | | | | |
| 3 * | | オキサリプラチン点滴静注 | 130mg/m ² | 点滴静注 | 末梢メイン | 2時間 | |
| | | 5%ブドウ糖500mL | 1本 | | | | |
| 4 | | 生理食塩液50mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 5分 | |
| 5 * | | カペシタビン錠 | 2000mg/m ² | 内服 | 経口 | | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|--------|--------------|-----------------------|-----|
| 2 | アバステン点滴静注 | 7.5mg/kg | |
| 3 | オキサリプラチン点滴静注 | 130mg/m ² | |
| 5 | カペシタビン錠 | 2000mg/m ² | |

<特記事項>

①カペシタビンはday1夕～day15朝まで内服(朝・夕食後)。その後7日間休薬。

②カペシタビン投与量(2000mg/m²/day)

BSA <1.36m² 1.36-1.66m² 1.66-1.96m² 1.96m² ≤

用量 2400mg/day 3000mg/day 3600mg/day 4200mg/day