




薬剂委员会结果报告



2023年10月4日 開催

➤ 薬剂マスタ登録: 10月12日予定



新規採用医薬品

商品名	アロカリス点滴静注235mg		
成分名 メーカー	ホスネツピタント塩化物塩酸塩 大鵬薬品工業株式会社	薬価	11,276円/1バイアル
効能・効果	抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)(遅発期を含む)		
用法・用量	他の制吐剤との併用において、ホスネツピタントとして235mgを抗悪性腫瘍剤投与1日目に1回、点滴静注		
分類	劇薬	保管条件	冷所保存
製剤写真			 <p>5バイアル包装</p>
	<p>本体写真</p>		 <p>内部個別包装</p>
使用成績調査 等対象品目	なし	備考	代替削除品:アプレピタントカプセル 125mg,80mg「NK」
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 肝機能障害時の注意事項:中等度以上の肝機能障害患者(Child-Pughスコア7以上)では血中濃度の恐れ ✓ 腎機能障害時の注意事項:設定されていない ✓ 調剤・調製に関する注意事項: 泡立つため、輸液バッグ等に注入する際は緩徐に注入し、静かに転倒混和すること。 紙箱から取り出して長期間保存した場合は光により分解又は容易に着色するため、紙箱から取り出した後は速やかに使用するか又は遮光すること。 ✓ レセプト上の注意事項:なし 		

新規採用医薬品

商品名	ラゲブリオカプセル200 mg		
成分名 メーカー	モルヌピラビル MSD株式会社	薬価	200mg1カプセル:2,357.8円
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症		
用法・用量	1回800mgを1日2回、5日間経口投与		
分類	劇薬	保管条件	室温保存
製剤写真	* : 識別コード有り又は無しどちらか片方のカプセルが処方される 		
	本体写真	PTP・包装写真	
粉碎	不可 不可の理由: データなし。やむを得ない場合は脱カプセル後、水に溶解し懸濁液として投与する	分包	可
使用成績調査等対象品目	特定使用成績調査(連続登録方式) 骨髄抑制、過敏症について	備考	代替削除品: シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 腎機能障害時の注意事項: 肝機能による用量調節の必要はない ✓ 肝機能障害時の注意事項: 腎機能による用量調節の必要はない ✓ 調剤・調製に関する注意事項: 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に投与しないよう注意喚起する ✓ レセプト上の注意事項: SARS-CoV-2による感染症の重症化リスク因子を有する等、本剤の投与が必要と考えられる患者に投与すること。また、本剤の投与対象については最新のガイドラインも参考にすること。 ✓ その他: 特例承認医薬品 		



新規採用医薬品

商品名	パキロビッドパック600 パキロビッドパック300		
成分名 メーカー	ニルマトレルビル/リトナビル ファイザー株式会社	薬価	パキロビッド® パック600(1シート) : 19,805.50円 パキロビッド® パック300(1シート) : 12,538.60円
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症		
用法・用量	ニルマトレルビルとして1回300 mg・リトナビルとして1回100 mgを同時に1日2回、5日間経口投与 中等度の腎機能障害患者(30mL/min ≤ eGFR < 60mL/min)には、ニルマトレルビルとして1回150mg・リトナビルとして1回100mgを同時に1日2回、5日間経口投与		
分類	劇薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
粉砕	不可 不可の場合理由: データなし	分包	不可 不可の場合理由: データなし
使用成績調査 等対象品目	一般使用成績調査(連続調査方式) 一部の特定されたリスク・潜在的リスクについて	備考	代替削除品: 注射用エンドキサン100
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 肝機能障害時の注意事項: 肝機能障害のある患者で、コルヒチンを投与中の患者は禁忌 ✓ 腎機能障害時の注意事項: 腎機能障害のある患者で、コルヒチンを投与中の患者は禁忌 ✓ レセプト上の注意事項: SARS-CoV-2による感染症の重症化リスク因子を有する等、本剤の投与が必要と考えられる患者に投与すること。また、本剤の投与対象については最新のガイドラインも参考にすること。 ✓ その他: 特例承認医薬品 		



新規採用医薬品(院外採用)

商品名	ドプテレット錠20mg		
成分名 メーカー	アバロンボパグマレイン酸塩 旭化成ファーマ(株)	薬価	20mg1錠 7106.60円
効能・効果	待機的な観血的手技を予定している慢性肝疾患患者における血小板減少症の改善		
用法・用量	<p>アバロンボパグとして以下の用量を1日1回、5日間食後に経口投与する。</p> <p>投与開始前の血小板数が40,000/μL以上50,000/μL未満: 40mg 投与開始前の血小板数が40,000/μL未満: 60mg</p> <p>※観血的手技の施行予定日の10日～13日前を目安に開始すること。本剤を再投与した際に有効性及び安全性は、検討されていない。血小板数50,000/μL未満に低下していない患者では、他の治療法を選択すること。</p>		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		PTP・包装写真
粉碎	不可 不可の場合理由: データが無い	分包	不可 不可の場合理由: データが無い
使用成績調査 等対象品目	市販直後調査 製造販売後データベース調査(詳細調査中)	流通 備考	メディセオ(SPLine株) 一社流通
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 肝機能障害時の注意事項: 重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)にある患者は慎重投与 ✓ 腎機能障害時の注意事項: なし ✓ 調剤・調製に関する注意事項: 服用直前にブリスターシートから取り出すよう指導すること ✓ レセプト上の注意事項: 観血的手技の名称及び実施予定年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること ✓ その他: 開腹、開胸、開心、開頭又は臓器切除を伴う観血的手技の場合は、本剤の投与を避けること 		

新規採用医薬品(院外採用)

商品名	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		
成分名 メーカー	レバミピド 参天製薬株式会社	薬価	2%5mL 1瓶 460.50円
効能・効果	ドライアイ		
用法・用量	通常、1回1滴、1日4回点眼する		
分類	点眼剤	保管条件	遮光、室温保存
製剤写真			
	本体写真		
使用成績調査 等対象品目	なし	流通 備考	なし
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 肝機能障害時の注意事項:なし ✓ 腎機能障害時の注意事項:なし ✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし ✓ レセプト上の注意事項:なし ✓ その他:なし 		

新規採用医薬品(院外採用)

商品名	ベレキシブル錠80mg		
成分名 メーカー	チラブルチニブ塩酸塩 小野薬品工業株式会社	薬価	5067.4円／錠
効能・効果	○再発又は難治性の中枢神経系原発リンパ腫 ○原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫		
用法・用量	1日1回480mgを空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。		
分類	劇薬／抗悪性腫瘍剤	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		PTP・包装写真
粉碎	不可 不可の場合理由: 抗悪性腫瘍剤	分包	不可 不可の場合理由: 抗悪性腫瘍剤
使用成績調査 等対象品目	全例調査(登録のみ)	流通 備考	流通制限あり (全例調査登録協力可能かつ施設要件、医師要件を満たした場合のみ)
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 肝機能障害時の注意事項: 主として肝臓で代謝されるため、血中濃度が上昇するおそれがある ✓ 腎機能障害時の注意事項: 設定されていない。 ✓ 調剤・調製に関する注意事項: なし ✓ レセプト上の注意事項: なし ✓ その他: なし 		

その他

① 院内採用品の切替

採用中止医薬品	切替医薬品
ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」
デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」	メサデルムクリーム0.1%(先発品)
アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	ジスロマック錠250mg(先発品)
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」
ベンズブロマロン錠50mg「杏林」	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」
ベラプロストNa錠20 μ g「テバ」	ベラプロストNa錠20 μ g「VTRS」

その他

② 医薬品共同入札に伴う採用薬変更

	現行	変更
内服薬	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」
	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」
	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」
	エスゾピクロン錠2mg「DSEP」	エスゾピクロン錠2mg「トーワ」
	センノシド錠12mg「サワイ」	センノシド錠12mg「サンド」
	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」
	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチンカプセル20mg「明治」
	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」
	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」
	ファモチジンOD錠10mg「テバ」	ファモチジンOD錠10mg「トーワ」
	ファモチジンOD錠20mg「テバ」	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」
	リマプロスタアルファデクス錠5 μ g「日医工」	リマプロスタアルファデクス錠5 μ g「サワイ」
注射薬	アルプロスタジル注10 μ g「NIG」	アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」
	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」
	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」

(内服12品目、注射3品目)