

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : MA-7

レジメン名称 : PTX+RAM

適応がん種 : 胃癌

インターバル日数 : 28日

予定コース数 : PDになるまで

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

消化器外科 : 医長 中田 博

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)		
1		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	15分	Rp1 15分 デキサート注6.6mg ファモチジン注20mg ポララミン注5mg 生理食塩液50mL ↓ Rp2 1時間 サイラムザ注 生理食塩液250mL ↓ Rp3 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp4 1時間 パクリタキセル注 5%ブドウ糖液250mL ↓ Rp5 5分 生理食塩液50mL	Rp1 15分 デキサート注6.6mg ファモチジン注20mg ポララミン注5mg 生理食塩液50mL ↓ Rp4 1時間 パクリタキセル注 5%ブドウ糖液250mL ↓ Rp5 5分 生理食塩液50mL	Rp1 15分 デキサート注6.6mg ファモチジン注20mg ポララミン注5mg 生理食塩液50mL ↓ Rp2 1時間 サイラムザ注 生理食塩液250mL ↓ Rp3 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp4 1時間 パクリタキセル注 5%ブドウ糖液250mL ↓ Rp5 5分 生理食塩液50mL		
		ファモチジン注 20mg	1A								
		ポララミン注5mg	1A								
		生理食塩液 50mL	1本								
2 *		サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	点滴静注	末梢メイン	1時間					
		生理食塩液 250mL	1本			※総量250mL ※インラインフィルター					
3		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分					
4 *		パクリタキセル点滴静注液	80mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	1時間					
		5%ブドウ糖液 250mL	1本			※インラインフィルター					
5		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分					

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	
4	パクリタキセル点滴静注液	80mg/m ²	

<備考>

- ①パクリタキセル投与時にはインラインフィルターの使用必須
- ②2剤併用する際はinfusion reaction(IR)がサイラムザによるものかを確認するため、1時間の経過観察時間を設定しており、最初の2サイクルは必須、発現がなければ3サイクル以降は省略可となっていた(臨床試験施行時)→サイラムザによるIRは、ほぼ全例がサイラムザ投与中に見られることが明らかとなったため経過観察時間は省略とした
- ③ザンタック自主回収のためファモチジン注へ変更、レスタミン錠をポララミン注へ変更