

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-61

レジメン名称 : Atezoli+CBDCA+PEM(1コース目)

適応がん種 : 非小細胞肺癌

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : 4コース

医 長 名 : 呼吸器内科 田村 厚久

申請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

確認薬剤師名 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)
1		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	Rp1 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp2 1時間 テセントリク点滴静注 生理食塩液250mL ↓ Rp3 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp4 15分 DEX6.6mg+パロノセトロンバイアル +アロカリスバイアル +生理食塩液50mL ↓ Rp5 10分 ペムトレキセド注 生理食塩液100mL ↓ Rp6 1時間 カルボプラチン注 生理食塩液250mL ↓ Rp7 5分 生理食塩液50mL
2 *		テセントリク点滴静注 生理食塩液 250mL	1200mg 1本	点滴静注	末梢メイン	1時間 ※インラインフィルター使用	
3		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
4		デキササート注(デキサメタゾンとして) パロノセトロンバイアル0.75mg アロカリスバイアル235mg 生理食塩液 50mL	6.6mg 1V 1V 1本	点滴静注	末梢メイン	15分	
5 *		ペムトレキセド注射用 生理食塩液100mL	500mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢メイン	10分	
6 *		カルボプラチン注 生理食塩液250mL	AUC6 1本	点滴静注	末梢メイン	1時間	
7		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	テセントリク点滴静注	1200mg	1200mg
5	ペムトレキセド注射用	500mg/m <sup>2</sup>	
6	カルボプラチン注	AUC6	900mg

<特記事項>

- ① 1～4コース目のレジメンであり、5コース目以降は維持療法用のレジメンとなる。
- ② ペムトレキセド使用レジメンのため、治療開始7日前よりバンピタン、フレズミンを使用する。その後バンピタンは連日内服、フレズミンは9週毎に投与する。ペムトレキセド最終投与後、3週間は投与する。
- ③ ペムトレキセドによる皮疹が懸念される場合は、投与前日～投与翌日までの3日間デキサメタゾン錠4mg×2回/日の内服が推奨される。
- ④ テセントリク点滴時にはインラインフィルターの使用が必須。
- ⑤ 1コース目用のレジメンであり、テセントリクの点滴時間に注意。
- ⑥ カルボプラチン点滴静注の最大投与量は900mg/dayまでとする。