

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : XELO

レジメン名称 : XELOX

適応がん種 : 大腸

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

インターバル日数 : 21日

消化器外科 : 医長 中田 博

予定コース数 : PDまで

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)
1		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	15分	Rp1 15分 デキサート注6.6mg アロキシバイアル0.75mg 生理食塩液50mL ↓ Rp2 2時間 オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液500mL ↓ Rp3 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp4 day(1)夕食後～day(15)朝食後 カペシタビン錠 1日2回内服
		アロキシバイアル0.75mg	1V				
		生理食塩液50mL	1本				
2 *		オキサリプラチン点滴静注	130mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	2時間	
		5%ブドウ糖500mL	1本				
3		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
4 *		カペシタビン錠	2000mg/m ²	内服	経口		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	オキサリプラチン点滴静注	130mg/m ²	
4	カペシタビン錠	2000mg/m ²	

<特記事項>

①カペシタビンはday1夕～day15朝まで内服(朝・夕食後)。その後7日間休薬。

②カペシタビン投与量(2000mg/m²/day)

BSA <1.36m² 1.36-1.66m² 1.66-1.96m² 1.96m² ≤

用量 2400mg/day 3000mg/day 3600mg/day 4200mg/day