

手術時に休薬が必要な経口女性ホルモン製剤

分類	一般名	薬品名	休薬期間
卵胞ホルモン	結合型エストロゲン	プレマリン錠	手術前4週以内（慎重投与）
卵胞ホルモン 黄体ホルモン配合剤	経口 避妊 薬	エチニルエストラジオール ・ドロスピレノン	ヤーズフレックス配合錠 ヤーズ配合錠
		エチニルエストラジオール ・ノルエチステロン	ルナベル配合錠LD・ULD フリウェル配合錠LD・ULD
		エチニルエストラジオール ・レボノルゲストレル	ジェミーナ配合錠
	エチニルエストラジオール ・ノルエチステロン	シンフェーズT28錠	(禁忌) 手術前4週以内 手術後2週以内
	エチニルエストラジオール ・デソゲストレル	ファポワール錠21・28 マーベロン21・28	
	エチニルエストラジオール ・レボノルゲストレル	アンジュ21錠・28錠 トリキュラー錠21・28 ラベルフィーユ21錠・28錠	
黄体ホルモン	メドロキシプロゲステロン 酢酸エステル	ヒスロンH錠 プロゲストン錠200	手術後1週間以内（禁忌） 手術後1カ月以内（慎重投与）
SERM	ラロキシフェン塩酸塩	エビスタ錠	長期不動状態（術後回復期、 長期安静期等）に入る3日前に は本剤を中止し、完全に歩行可 能になるまで再開しないこと
	バゼドキシフェン酢酸塩	ビビアント錠	長期不動状態（術後回復期、 長期安静期等）に入る3日前に は本剤を中止し、完全に歩行可 能になるまで再開しないこと