

# 膵がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
nab-PTX+GEM	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	125mg/m <sup>2</sup>	30分	Day1,8,15	28日	軽度
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	Day1,8,15		
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	14日	高度
	レボホリナートカルシウム	200mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	~Day3		
GS	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	Day1,8	21日	軽度
	S-1	60mg/m <sup>2</sup> /日	内服	Day1~14		
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	Day1,8,15	28日	軽度
術前GS	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	Day1,8	21日	軽度
	S-1	80mg/m <sup>2</sup> /日	内服	Day1~14		
nal-IRI+5-FU+/-LV	イリノテカン（リポソーム化）	70mg/m <sup>2</sup>	90分	Day1	14日	中等度
	レボホリナートカルシウム	200mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	~Day3		