

平成30年度 7月 薬事委員会結果報告

1. 新規採用医薬品(16品目)

| No | 医薬品名                     | 区分 | 一般名          | 製薬会社       | 規格      | 薬価      | 薬効                      | 備考                       |
|----|--------------------------|----|--------------|------------|---------|---------|-------------------------|--------------------------|
| 1  | エルカルチンFF内用液10% 分包 5mL    | 先  | レボカルニチン      | 大塚         | 5mL1包   | ¥348.90 | レボカルニチン製剤               |                          |
| 2  | ※クロピドグレル錠25mg「SANIK」     | 後  | クロピドグレル      | 日医工        | 25mg1錠  | ¥29.00  | 抗血小板剤                   | 先発:プラビックス                |
| 3  | ※クロピドグレル錠75mg「SANIK」     | 後  |              |            | 75mg1錠  | ¥70.20  |                         |                          |
| 4  | チラーヂンS散0.01%             | 先  | レボチロキシ       | あすか        | 0.01%1g | ¥58.00  | 甲状腺ホルモン剤                |                          |
| 5  | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」4mL | 後  | バルプロ酸ナトリウム   | 日医工        | 4mL1包   | ¥26.80  | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤     | 先発:セレニカ、デバケン             |
| 6  | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」    | 後  |              | エルドメットエーザイ | 40%1g   | ¥16.30  |                         |                          |
| 7  | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」        | 後  | フルニトラゼパム     | 共和         | 1mg1錠   | ¥5.60   | 不眠治療剤                   | ロピノール錠1mg経過措置満了:2019年3月末 |
| 8  | フロセミド細粒4%「EMEC」          | 後  | フロセミド        | エルドメットエーザイ | 4%1g    | ¥6.40   | 利尿降圧剤                   | 先発:ラシックス                 |
| 9  | フロセミド錠20mg「NP」           | 後  |              | ニプロ        | 20mg1錠  | ¥6.00   |                         |                          |
| 10 | ※ベポスタチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 後  | ベポスタチン       | ニプロ        | 10mg1錠  | ¥20.70  | 抗アレルギー剤                 | 先発:タリオン、後発:小児適応なし        |
| 11 | マラロン配合錠                  | 先  | アトパコン・プログアニル | GSK        | 1錠      | ¥498.10 | 抗マラリア剤                  | 予防目的:自費                  |
| 12 | メファキン「ヒサミツ」錠275          | 先  | メフロキン        | 久光         | 275mg1錠 | ¥783.70 | 抗マラリア剤                  | 予防目的:自費                  |
| 13 | リリカOD錠75mg               | 先  | プレバカリン       | ファイザー      | 75mg1錠  | ¥111.50 | 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤      | リリカカプセル75mgより切替          |
| 14 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」        | 後  | ケトコナゾール      | 日本ジェネリック   | 10g/本   | ¥192/本  | 外用抗真菌剤                  | 先発:ニゾラール                 |
| 15 | ケトコナゾールローション2%「JG」       | 後  |              |            |         |         |                         |                          |
| 16 | リボスチン点眼液0.025%           | 先  | レボカバステン      | 参天         | 5mL/本   | ¥610/本  | H <sub>1</sub> ブロッカー点眼剤 |                          |

※オーソライズド・ジェネリック:原薬、添加物および製法等が新薬と同一のジェネリック医薬品

2. 新規院外採用医薬品(5品目)

| No | 医薬品名               | 区分 | 一般名                         | 製薬会社  | 規格        | 薬価        | 薬効            | 備考                     |
|----|--------------------|----|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---------------|------------------------|
| 1  | ライゾデグ配合注フレックスタッチ   | 先  | インスリン テグルテク/<br>インスリン アスパルト | ノボ    | 300単位1キット | ¥2,206.00 | 溶解インスリンアナログ製剤 |                        |
| 2  | コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 | -  | コデインリン酸塩                    | 大日本住友 | 20mg1錠1錠  | ¥78.10    | 鎮咳剤<麻薬>       | コデインリン酸塩錠20mg「DSP」販売中止 |
| 3  | リクシアナOD錠15mg       | 先  | エドキサバン                      | 第一三共  | 15mg1錠    | ¥294.20   | 経口FXa阻害剤      | 規格により効能効果に相違あり         |
| 4  | リクシアナOD錠30mg       | 先  |                             |       | 30mg1錠    | ¥538.40   |               |                        |
| 5  | リクシアナOD錠60mg       | 先  |                             |       | 60mg1錠    | ¥545.60   |               |                        |

3. 医薬品の名称変更:後発医薬品の一般名称標記への変更に伴う(4品目)

| No | 旧医薬品名称(先発)            | 区分 | 会社名 | 薬効          | 変更後の医薬品名称              | 備考                  |
|----|-----------------------|----|-----|-------------|------------------------|---------------------|
| 1  | アチネス錠50mg(ミオナール)      | 後  | あすか | 筋緊張・痙性麻痺改善剤 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」     | 旧名称 経過措置満了:2019年3月末 |
| 2  | イサロン錠100mg            | 後  | あすか | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 | アルジオキサ錠100mg「あすか」      |                     |
| 3  | ギボンス錠1mg(テルネリン)       | 後  | 旭化成 | 筋緊張緩和剤      | チザニジン錠1mg「杏林」          |                     |
| 4  | ワークミンカプセル1.0(アルファロール) | 後  | あすか | 活性型ビタミンD製剤  | アルファカルシドールカプセル1μg「あすか」 |                     |

4. 販売中止医薬品(1品目)

| No | 販売中止医薬品名           | 区分 | 一般名      | 製薬会社  | 規格        | 薬価     | 薬効  | 備考              |
|----|--------------------|----|----------|-------|-----------|--------|-----|-----------------|
| 1  | トクレススパンスールカプセル30mg | -  | ベントシキペリン | 大日本住友 | 30mg1カプセル | ¥10.20 | 鎮咳剤 | 経過措置満了:2019年3月末 |

- 原則 翌月1日より処方可能です。院内採用医薬品からの切替の場合、院内在庫が無くなり次第となります。ご了承下さい。

5. 医薬品情報室より

重要な添付文書改訂について：DSU(医薬品安全対策情報)No.270(2018.6)

| 医薬品一般名<br>改訂箇所 |    | アミオダロン塩酸塩   | 212 不整脈用剤 |
|----------------|----|---|-----------|
|                |    | 改訂内容  |           |
| 「重大な副作用」       | 追記 | 無顆粒球症、白血球減少：<br>無顆粒球症、白血球減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止する等の適切な処置を行うこと。 |           |

<院外>採用医薬品：アンカロン錠

| 医薬品一般名<br>改訂箇所 |    | メトロニダゾール（経口剤、注射剤）   | 641 抗原虫剤 |
|----------------|----|---|----------|
|                |    | 改訂内容  |          |
| 「慎重投与」         | 追記 | コケイン症候群の患者  |          |
| 「重要な基本的注意」     | 追記 | 肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を実施するなど、患者の状態を十分に観察すること。  |          |
| 「重大な副作用」       | 追記 | 肝機能障害：<br>肝機能障害があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。<br>コケイン症候群の患者で重度の肝毒性又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。 |          |

採用医薬品：フラジール内服錠

| 医薬品一般名<br>改訂箇所 |    | ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール   | 619 その他の抗生物質製剤 |
|----------------|----|---|----------------|
|                |    | 改訂内容  |                |
| 「慎重投与」         | 追記 | (メトロニダゾール)<br>コケイン症候群の患者  |                |
| 「重要な基本的注意」     | 追記 | (メトロニダゾール)<br>肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を実施するなど、患者の状態を十分に観察すること。  |                |
| 「重大な副作用」       | 追記 | (メトロニダゾール)<br>肝機能障害があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。<br>コケイン症候群の患者で重度の肝毒性又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。 |                |

<院外>採用医薬品：ボノピオンパック

| 医薬品一般名<br>改訂箇所 |    | ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール  | 619 その他の抗生物質製剤 |
|----------------|----|---|----------------|
|                |    | 改訂内容  |                |
| 「慎重投与」         | 追記 | (メトロニダゾール)<br>コケイン症候群の患者  |                |
| 「重要な基本的注意」     | 追記 | (メトロニダゾール)<br>肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を実施するなど、患者の状態を十分に観察すること。  |                |
| 「重大な副作用」       | 追記 | (メトロニダゾール)<br>肝機能障害があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。<br>コケイン症候群の患者で重度の肝毒性又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。 |                |

<院外>採用医薬品：ランピオンパック