

令和1年度 5月 薬事委員会結果報告

1. 新規採用医薬品(11品目)

No	医薬品名	区分	一般名	製薬会社	規格	薬価	薬効分類	備考
1	ビブラマイシン錠100mg	先	ドキシサイクリン	ファイザー	100mg1錠	¥21.60	テトラサイクリン系 抗生物質	
2	カルベジロール錠10mg「トーワ」	後	カルベジロール	東和	10mg1錠	¥19.30	持続性高血圧・狭心症、 頻脈性心房細動治療剤	アーチスト錠10mg(¥48.3)より切替え
3	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	後		沢井	1.25mg1錠	¥9.90	慢性心不全治療剤	アーチスト錠1.25mg(¥13.3)より切替え
4	ファモチジンD錠20mg「日医工」	後	ファモチジン	日医工	20mg1錠	¥10.80	H2受容体拮抗剤	ガスターD錠20mg(¥29.0)より切替え
5	ファモチジン散10%「サワイ」	後		沢井	10%1g	¥76.10		ガスター散10%(¥190.3)より切替え
6	アゾセמיד錠30mg「JG」	後	アゾセמיד	日本ゼネリック	30mg1錠	¥10.40	持続型ループ利尿剤	ダイアート錠30mg(¥19.2)より切替え
7	カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」	後	カンデサルタン	東和	8mg1錠	¥37.60	持続性アンジオテンシンⅡ 受容体拮抗剤	プロプレス錠8mg(¥116.2)より切替え 口腔崩壊錠へ変更
8	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	後	ゾルピデム	東和	5mg1錠	¥12.80	入眠剤	マイスリー錠5mg(¥37.0)より切替え 口腔崩壊錠へ変更
9	ムコサル錠15mg	後	アンプロキシロール	サノフィ	15mg1錠	¥10.80	気管潤滑去痰剤	ムコソルバン錠15mg(¥15.8)より切替え ドライシロップと同名称
10	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	後	アトルバスタチン	東和	5mg1錠	¥19.10	HMG-CoA還元酵素 阻害剤	リビトール錠10mg(¥88.2)より切替え、 規格変更(10mg→5mg)、口腔崩壊錠
11	プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	後	プロチゾラム	共和	0.25mg	¥9.90	催眠鎮静剤	レンドルミンOD錠0.25mgより切替え

2. 新規院外採用医薬品(1品目)

No	医薬品名	区分	一般名	製薬会社	規格	薬価	薬効分類	備考
1	クエチアピン錠12.5mg「アメル」	後	クエチアピン	共和薬品	12.5mg1錠	¥9.90	抗精神病剤	セロクエル25mg(先発):採用

3. 医薬品情報室より

重要な添付文書改訂について：DSU(医薬品安全対策情報) No.278(2019.4)

医薬品一般名	クエチアピンプマル酸塩		117 精神神経用剤
改訂箇所	改定内容		
[重大な副作用]	追記	中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑： 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	

採用医薬品:セロクエル錠

医薬品一般名	ボノプラザンフマル酸塩	232 消化性潰瘍治療剤
改訂箇所	改定内容	
[重大な副作用]	追記	<u>中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u>

採用医薬品:タケキャブ錠

医薬品一般名	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	619 その他の抗生物質製剤
改訂箇所	改定内容	
[重大な副作用]	新設	(ボノプラザンフマル酸塩) <u>中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u>

採用医薬品:ボノサップパック

医薬品一般名	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	619 その他の抗生物質製剤
改訂箇所	改定内容	
[重大な副作用]	新設	(ボノプラザンフマル酸塩) <u>中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u>

採用医薬品:ボノピオンパック

医薬品一般名	オセルタミビルリン酸塩	625 抗ウイルス剤
改訂箇所	改定内容	
[重大な基本的注意]	追記	<u>出血があらわれることがあるので、患者及びその家族に対して、血便、吐血、不正子宮出血等の出血症状があらわれた場合には師に連絡するよう説明すること。</u>
[併用注意]	新設	<u>ワルファリン</u>

採用医薬品:タミフルカプセル、タミフルドライシロップ、オセルタミビルカプセル、オセルタミビルDS

医薬品一般名	バロキサビルマルボキシル	625 抗ウイルス剤
改訂箇所	改定内容	
[重大な基本的注意]	追記	<u>出血があらわれることがあるので、患者及びその家族に対して、血便、吐血、不正子宮出血等の出血症状があらわれた場合には師に連絡するよう説明すること。</u>
[併用注意]	新設	<u>ワルファリン</u>
[重大な副作用]	追記	<u>出血:</u> <u>血便、鼻出血、血尿等の出血があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。</u>

採用医薬品:ゾフルーザ錠