レジメン名称 ： 肛門癌 5-FU+MMC(放射線併用)

適応がん種 ： 肛門癌
インターバル日数 ： 28日
予定コース数 ： 2コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day()	day()	day()	day()
1		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	24時間	10:00	10:00	10:00	10:00				
2	＊	フルオロウラシル注	1000mg/㎡	点滴静注	末梢側管1	24時間	10:00	10:00	10:00	10:00				
		生理食塩液 500mL	1本											
3		デキサート注（デキサメタゾンとして）	6.6mg	点滴静注	末梢側管2	15分	10:00							
		グラニセトロン点滴静注液バッグ 3mg	1本											
4		デキサート注（デキサメタゾンとして）	6.6mg	点滴静注	末梢側管2	15分		10:00	10:00	10:00				
		生理食塩液 50mL	1本											
5	＊	マイトマイシン注用	10mg/㎡	点滴静注	末梢側管2	5分	10:15							
		注射用水 20mL	1A			※マイトマイシン注用1V(10mg)								
		生理食塩液 50mL	1本			をWZ10mLで溶解する								

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	フルオロウラシル注	1000mg/㎡	
5	マイトマイシン注用	10mg/㎡	20mg/body

＜備考＞