

レジメン名称 : 大腸癌 Cetu+FOLFIRI<初回用>(Cetu day1 120分)

適応がん種 : EGFR陽性の進行・再発大腸癌

インターバル日数 : 14日

予定コース数 : PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 20mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	ラインキープ用	10:00	10:00						
2		デキサート注(デキサメタゾンとして) ポララミン注 5mg アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	6.6mg 1A 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	15分	10:00							
3		デキサート注(デキサメタゾンとして) ポララミン注 5mg 生理食塩液 50mL	6.6mg 1A 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	15分		10:00						
4 *		アービタックス注射液 生理食塩液 500mL	400mg/m ² (初回) 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	2時間 ※総量500mL	10:15							
5 *		アービタックス注射液 生理食塩液 250mL	250mg/m ² (2回目以降) 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	1時間 ※総量250mL		10:15						
6		生理食塩液 250mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	1時間 ※経過観察用	12:15	11:15						
7 *		イリノテカン塩酸塩点滴静注液 5%ブドウ糖液 250mL	150mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	90分	13:15							
8 *		レボホリナート点滴静注用 5%ブドウ糖液 250mL	200mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(側管)	2時間	13:15							
9 *		フルオロウラシル注	400mg/m ²	静脈注射	CVポート(メイン)	3分	15:15							
10 *		フルオロウラシル注 生理食塩液 100mL	2400mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	46時間 ※総量100mL 注入器具:シユア-フューザー	15:18							
11		生食注シリンジ 10mL	1本	ヘパリンロック	CVポート(メイン)	抜針時のラインフラッシュ用								

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	アービタックス注射液	400mg/m ² (初回)	
5	アービタックス注射液	250mg/m ² (2回目以降)	
7	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150mg/m ²	
8	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	
9	フルオロウラシル注	400mg/m ²	
10	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	

<備考>