

レジメン 名称 : 大腸癌 ギルトラップ+FOLFIRI

適応がん種 : 大腸癌  
 インターバル日数 : 14日  
 予定コース数 : PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 20mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	ラインキープ用	10:00						
2	*	ギルトラップ点滴静注 生理食塩液100mL	4mg/kg 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	1時間	10:00						
3		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	6.6mg 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	15分	11:00						
4	*	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 5%ブドウ糖液 250mL	150mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	90分	11:15						
5	*	レボホリナート点滴静注用 5%ブドウ糖液 250mL	200mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	CVポート(側管)	2時間	11:15						
6	*	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	静脈注射	CVポート(メイン)	3分	13:15						
7	*	フルオロウラシル注 生理食塩液 100mL	2400mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	46時間 ※総量100mL 注入器具:シユア-フユ-ザ-	13:18						
8		生食注シリンジ 10mL	1本	フラッシュ用	CVポート(メイン)	抜針時のラインフラッシュ用							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	ギルトラップ点滴静注	4mg/kg	
4	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150mg/m <sup>2</sup>	
5	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	
6	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	
7	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	

<p>&lt;特記事項&gt;</p>
---------------------