

レジメン名称：胃癌 MTX/5-FU

適応がん種：胃癌
 インターバル日数：7日
 予定コース数：PDIになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00						
2		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 50mL	3.3mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	10:00						
3		ダイアモックス注射用 500mg 生理食塩液 50mL	0.5V 1本	点滴静注	末梢側管	15分	10:15						
4 *		メソトレキセート 5%ブドウ糖液 250mL	100mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	15分	10:30						
5		ソルデム3A 500mL メイロン静注 7% 20mL ヘパリンNa注 1万単位	1本 2A 0.25V	点滴静注	末梢側管	3時間	10:45						
6 *		フルオロウラシル注 生理食塩液 50mL	600mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	5分	13:45						

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	メソトレキセート	100mg/m ²	
6	フルオロウラシル注	600mg/m ²	

<備考>
 ・ロイコボリン錠(10mg/m²)を2日間(day2-3)内服
 (MTX投与24時間後より開始6時間毎に6回投与)