

レジメン名称：胃癌 Nivolumab+FOLFOX

適応がん種：胃癌  
 インターバル日数：14日  
 予定コース数：PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理注シリンジ 10mL「NP」	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	ラインキープ用	10:00						
2		生理食塩液100mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	30分で	10:00						
	*	オブジーボ	240mg/body										
3		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	15分で	10:30						
4		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	CVポート(メイン)	15分	10:45						
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本										
5	*	オキサリプラチン注射液	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	CVポート(メイン)	2時間	11:00						
		5%ブドウ糖液 250mL	1本										
6	*	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	CVポート(側管)	2時間	11:00						
		5%ブドウ糖液 250mL	1本										
7	*	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	静脈注射	CVポート(メイン)	3分	13:00						
8	*	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	CVポート(メイン)	46時間	13:03						
		生理食塩液 100mL	1本			※総量100mL							
						注入器具:シュアーフューザー							
9		ヘパリンNaロックシリンジ <sup>®</sup> 10mL	1本	ヘパリンロック	CVポート(メイン)	抜針時のラインフラッシュ用							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	オブジーボ	240mg/body	
5	オキサリプラチン注射液	85mg/m <sup>2</sup>	
6	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	
7	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	
8	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	

<備考>