レジメン名称 ： 胃癌 5FU/l-LV+HER<初回用>(HER day1 90分)(HER day1,22,43)

適応がん種 ： HER2陽性胃癌
インターバル日数 ： 56日
予定コース数 ： PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day(29)	day(36)	day(43)	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
2	＊	ハーセプチン注射用	8mg/kg	点滴静注	末梢側管	90分	10:00							
		生理食塩液 250mL	1本											
3	＊	ハーセプチン注射用	6mg/kg	点滴静注	末梢側管	30分				10:00			10:00	
		生理食塩液 250mL	1本											
4		デキサート注(デキサメタゾンとして)	3.3mg	点滴静注	末梢側管	15分	11:30	10:00	10:00	10:30	10:00	10:00		
		生理食塩液 50mL	1本											
5	＊	レボホリナート点滴静注用	250mg/㎡	点滴静注	末梢側管	2時間	11:45	10:15	10:15	10:45	10:15	10:15		
		5%ブドウ糖液 250mL	1本											
6	＊	フルオロウラシル注	600mg/㎡	静注	末梢側管	5分	13:45	12:15	12:15	12:45	12:15	12:15		
		生理食塩液 20mL	1本			※総量25mL								

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	ハーセプチン注射用	8mg/kg	
		(初回)	
3	ハーセプチン注射用	6mg/kg	
		(2回目以降)	
5	レボホリナート点滴静注用	250mg/㎡	
6	フルオロウラシル注	600mg/㎡	

＜備考＞