レジメン名称 : 膵癌 Nab-PTX+GEM

適応がん種 : 膵癌
インターバル日数 : 28日
予定コース数 : PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00	10:00					
2		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	15分	10:00	10:00	10:00					
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本											
3		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管	5分	10:15	10:15	10:15					
4	*	アブラキサン点滴静注用	125mg/㎡	点滴静注	末梢側管	30分	10:20	10:20	10:20					
		生理食塩液 50mL	1本		※5mg/mLの懸濁液が投与量分入ったものをNS50mLの空ボトルに詰めて払い出し									
5		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管	5分	10:50	10:50	10:50					
6	*	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/㎡	点滴静注	末梢側管	30分	10:55	10:55	10:55					
		5%ブドウ糖液 100mL	1本			total100mLにする								

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	アブラキサン点滴静注用	125mg/㎡	
6	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/㎡	

＜備考＞