

レジメン名称： 膵臓癌 オニバイド療法

適応がん種： 膵臓癌

インターバル日数： 14日

予定コース数： PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()
1		生食注シリンジ「NP」 10mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	ラインキープ用	10:00					
2		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	6.6mg 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	15分	10:00					
3	*	オニバイド点滴静注 5%ブドウ糖液 500mL	70mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	90分 *total500mLにする	10:15					
4		生食50mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	10分	11:45					
5	*	レボホリナート点滴静注用 5%ブドウ糖液 250mL	200mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	2時間	11:55					
6	*	フルオロウラシル注 生理食塩液 100mL	2400mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	46時間 ※総量100mL 注入器具:シアーフューザー	13:55					
7		ヘパリンNaシリンジ100単位/10mL	1本	フラッシュ用	CVポート(メイン)	抜針時のラインフラッシュ用						

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	オニバイド点滴静注	70mg/m ²	70mg/m ²
5	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	200mg/m ²
6	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	2400mg/m ²

<備考>