

レジメン 名称 : 食道癌 FP+Pembrolizumab

適応がん種 : 食道癌  
 インターバル日数 : 21日  
 予定コース数 : 6コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	9:00							
		KCL注シリンジ 10mEq	1キット											
		硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	8mL											
2	*	フルオロウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢側管1	24時間	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00			
		生理食塩液 500mL	1本											
3		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	10:30							
4		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間	12:00							
5		イメンドカプセル 125mg	1C	内服	経口	※シスプラチン投与 1時間前までに服用	12:00							
6		イメンドカプセル 80mg	1C	内服	経口			午前中	午前中					
7	*	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	末梢側管2	30分	12:30							
		生理食塩液 100mL	1本			※インラインフィルター使用								
8		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢側管2	15分	13:00							
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本											
9	*	シスプラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢側管2	2時間	13:15							
		生理食塩液 500mL	1本			※総量500mL								
10		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管2	30分	15:15							
11		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00			
12		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管2	30分		10:00	10:00	10:00				
		生理食塩液 100mL	1本											
13		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間		10:00	10:00	10:00	10:00			

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	フルオロウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	
7	キイトルーダ	200mg/body	
9	シスプラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	

<備考>