

レジメン名称：非ホジキンリンパ腫 ガザイバ維持療法

適応がん種：非ホジキンリンパ腫

インターバル日数：28日

予定コース数：最長2年

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		ポララミン2mg	1錠	経口	内服		10:00						
		アセトアミノフェン500mg	2錠	経口	内服		10:00						
2		生理食塩液100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00						
3		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢側管	15分で	10:00						
		デキサート注(デキサメタゾンとして)	19.8mg										
4 *		生理食塩液250mL	1本	点滴静注	末梢側管	投与時間(単位:ml/h)	10:15						
		ガザイバ点滴静注	1000mg/body			*前回投与時にG3以上のinfusion reactionなければ2クール目以降25mL/hから開始し30分後に225mL/hまで速度を上げることができる。 *0.2または0.22μmインラインフィルターを使用する。*総量250mLにする							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	ガザイバ点滴静注	1000mg/body	

<備考>
 ・ガザイバ投与開始30分～1時間前に、抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤を投与すること
 ※ガザイバ投与日に経口の副腎皮質ホルモン剤を含む化学療法を投与する場合は、その経口の副腎皮質ホルモン剤をガザイバ投与1時間前までに投与することも可能