

| | | | |
|-------------------|--|------|--|
| 診療科 | 消化器科 | 管理番号 | |
| レジメン名称 | GEM+nab-PTX 麟Ca | | |
| 対象疾患・ステージ・適応外の有無等 | 肺癌 | | |
| 本治療の位置づけ | GEM単剤と比較し有効性が示されており、肺癌に対する一次治療の一つとして位置づけられている。 | | |

| | 投与順 | 薬剤 | 投与量 | 時間 | 投与方法 | 投与スケジュール | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|-----------------------|-----|------|----------|-----|------|------|----|----|----|----|--|
| | | | | | | 1日目 | 8日目 | 15日目 | 22日目 | 日目 | 日目 | 週目 | 週目 | |
| 治療内容 | Rp1 | デキサメタゾン | 6.6mg | 30分 | iv | ● | ● | ● | | | | | | |
| | | グラニセトロンバック | 100ml | | | | | | | | | | | |
| | Rp2 | アブラキサン | 125mg/m ² | 30分 | iv | ● | ● | ● | | | | | | |
| | | 生食 | 50ml | | | | | | | | | | | |
| | Rp3 | 生食 | 50ml | 15分 | iv | ● | ● | ● | | | | | | |
| | Rp4 | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | 30分 | iv | ● | ● | ● | | | | | | |
| | | 生食 | 100ml | | | | | | | | | | | |
| | Rp5 | 生食 | 50ml | 15分 | iv | ● | ● | ● | | | | | | |
| | 総投与時間 | 約2時間 | | | | | | | | | | | | |
| | 血管外漏出時のリスク | アブラキサン:起壊死性薬剤 GEM:炎症性薬剤 | | | | | | | | | | | | |
| (備考)調製時・投与時の注意点など | アブラキサンは血液製剤 溶液を冷蔵庫に保存すると結晶が析出することがあるので、保存する場合でも室温(15~30℃)で保存し、24時間以内に使用すること。 アブラキサン投与時には、インラインフィルターは使用しないこと。 | | | | | | | | | | | | | |
| 1サイクル期間 | 4週間。週1回投与を3週間連続、4週目は休薬。 | | | | | | | | | | | | | |
| 総コース数 | 可能な限り | | | | | | | | | | | | | |