

診療科	消化器内科	管理番号	
レジメン名称	nal-IRI+5-FU+I-LV		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵癌		
本治療の位置づけ	GEMベースの化学療法が奏功しなかった場合の2次治療		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール												
						1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目					
治療内容	Rp 1	生食シリンジ	10mL	フラッシュ	cv	●												
	Rp 2	アロキシ点滴静注バック	50mL	200mL/h	cv	●												
		デキサート	9.9mg	15分														
	Rp 3	オニバイド	70mg/m ²		cv	●												
		ブドウ糖注射液5%	500mL	90分														
	Rp 4	生理食塩水	50mL	フラッシュ	cv													
	Rp 5	レボホリナート	200mg/m ²	125mL/h	cv	●												
		5%ブドウ糖液	250mL	2hr														
	Rp 6	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続	cv	●												
		生理食塩液	全量92mLとし、インヒューザーポンプで投与															
		※入院の場合は生食500mLに入れる。																
	総投与時間	約50時間																
	1サイクル期間	2週																
	総コース数	可能な限り継続																