

| | | | |
|-------------------|--|------|--|
| 診療科 | 消化器外科 | 管理番号 | |
| レジメン名称 | S-1+CDDP 胃Ca | | |
| 対象疾患・ステージ・適応外の有無等 | 進行・再発胃癌 | | |
| 本治療の位置づけ | 現在、本邦でHER2ネガティブの進行胃がんのファーストラインに位置づけられている化学療法である。ただし、CDDP、S-1ともに腎機能障害時の使用には注意が必要である。また、CDDPによる腎障害の予防のためハイドレーションが必要とされ、心機能が低下しているケース、大量の腹水が貯留しているケースなどでも使用ができない。 | | |

| | 投与順 | 薬剤 | 投与量 | 時間 | 投与方法 | 投与スケジュール | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|---------------------------------|---------------------|-------|----------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
| 治療内容 | Rp 1 | ソルデム3A | 500ml | 1.5時間 | | | | ● | | | | | | |
| | Rp 2 | グラニセロンパック | 100ml | 30分 | | | | ● | | | | | | |
| | | プロイメンド | 150mg | | | | | | | | | | | |
| | | デキサメタゾン | 9.9mg | | | | | | | | | | | |
| | | デキサメタゾン | 6.6mg | 15分 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| | | 生食 | 50ml | | | | | | | | | | | |
| | | Rp 3 | YDソリタT1 | 500ml | 1.5時間 | | | | ● | | | | | |
| | | | 硫酸Mg補正液 | 8mEq | | | | | | | | | | |
| | | Rp 4 | マンニトール | 200ml | 30分 | | | | ● | | | | | |
| | | Rp 5 | 生食 | 500ml | 2時間 | | | | ● | | | | | |
| | | | シスプラチン注 | 60mg/m ² | | | | | | | | | | |
| | | Rp 6 | YDソリタT1 | 1000ml | 3時間 | | | | ● | | | | | |
| | | Rp 7 | ソルデム3A | 500ml | 1.5時間 | | | | ● | | | | | |
| | | | ソルデム3A | 1000ml | 4時間 | | | | | ● | ● | ● | | |
| | | TS-1 | 体表面積 | 分2(朝、夕食後)、day1-21 | | | | | | | | | | |
| | | | 1.25m ² 未満:80mg | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.25~1.5m ² 未満:100mg | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.5m ² 以上:120mg | | | | | | | | | | | |
| | | | デキサメタゾン 経口 | 8mg | | | | | | 分2(朝・昼)day9~11 | | | | |
| | 総投与時間 | | | | | | | | | | | | | |
| 1サイクル期間 | 5週間 | | | | | | | | | | | | | |