

診療科	消化器内科	管理番号	
レジメン名称	FOLFOXIRI療法		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	切除不能進行大腸癌		
本治療の位置づけ	1st line		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
						1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
治療内容	Rp 1	生食シリンジ	10mL		cv	●							
	Rp 2	アロキシ点滴静注バック	50mL	100mL/h	cv	●							
		デキサート	9.9mg	30分									
		プロイメンド	150mg										
	Rp 3	生食100mL	100mL	200mL/h	cv	●							
				30分									
	Rp 4	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	125mL/h	cv	●							
		ブドウ糖注射液5%	250mL	1h									
	Rp 5	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	125mL/h	cv	●							
		5%ブドウ糖液	250mL	2h									
	Rp 6	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	125mL/h	cv	●							
		5%ブドウ糖液	250mL	2h									
		(レボホリナートと同時に)											
	Rp 7	フルオロウラシル	※3000mg/m <sup>2</sup>										
		生理食塩液	500mL	48時間持続	cv	●							
		5FUの投与慮は文献では3200mgだが添付文書の上限を考慮した。											
	総投与時間	53時間											
	1サイクル期間	2週											