

診療科	血液内科	管理番号	
レジメン名称	Kd (once weekly)		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	再発難治性多発性骨髄腫		
本治療の位置づけ	再発難治性多発性骨髄腫に対する2nd line以降の治療である。免疫調節薬が入ったレジメンの後にクラススイッチして使用する。また免疫調節薬と併用するKRd療法に比し、frailな患者、高齢患者にも使用しやすい。		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	2日目	8日目	9日目	15日目	16日目	22日目	23日目	
治療内容	Rp1 <sup>※1</sup>	生理食塩液	250mL	60g分	点滴静注	●		●		●				
	Rp2	デキサメタゾン	39.6mg <sup>※2</sup>	15分	点滴静注	●		●		●		※3		
		生理食塩液	50mL											
	Rp3	5%ブドウ糖液	50mL	15分	点滴静注	●		●		●				
	Rp4	カルフィルゾミブ	70mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注	● <sup>※4</sup>		●		●				
		5%ブドウ糖液	50mL											
	※1…使用根拠となる臨床試験ではサイクル1のみ規定されているが、当院では既存のKd療法のレジメン同様、レジメンには組み込まず、必要に応じて別途オーダーすることとする。													
	※2…使用根拠となる臨床試験では40mg/body													
	※3…使用根拠となる臨床試験ではサイクル1～9のみ投与とされているが、当院では全サイクルで投与なしとする。													
	※4…サイクル1の1日目のみ20mg/m <sup>2</sup>													
総投与時間	60分(サイクル1～9の1,8,15日目及びサイクル10以降)、30分(サイクル1～9の22日目)													
1サイクル期間	28日間													
総コース数	PDまで													