

診療科	血液内科	管理番号	
レジメン名称	Kpd療法		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	再発難治性多発性骨髄腫、日本血液学会の造血器腫瘍診療ガイドライン2018上、保険適応外という記載はない。		
本治療の位置づけ	再発難治性骨髄腫に対する救援療法として、ボルテゾミブやレナリドミドに耐性の症例には使用が検討される。Phase II の臨床試験段階ではあるが、非常に高い効果が得られている。造血器腫瘍診療ガイドライン2018上も再発難治例の治療選択肢として記載がある。		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
						1日目	2日目	8日目	9日目	15日目	16日目	21日目	22日目
治療内容		レナデックス錠4mg	5T	カイトロリス投与 30分以上前	p.o	●	●	●	●	●	●		
	Rp1	カイトロリス点滴静注	20mg/m ²	10分	i.v	●	●						
		注射用水				(1コース目のみ)							
		5%ブドウ糖液											
		カイトロリス点滴静注	27mg/m ²	10分	i.v	●	●	●	●	●	●		
		注射用水				(2コース以降)							
		5%ブドウ糖液											
		ポマリスト4mg	1カプセル			p.o	1日目⇔21日目						
	総投与時間	10分											
血管外漏出時のリスク	イリタント薬												
(備考)調製時・投与時の注意点など	カイトロリス点滴静注10mgは5mL、40mgは20mLの注射用水で溶解して2mg/mLの濃度とした後、体表面積から計算した必要量を5%ブドウ糖液にて希釈すること。												
1サイクル期間	28日間												