

診療科	呼吸器内科	管理番号		申請医師	
レジメン名称	CBDCA+nab-PTX+Dur+Trem				
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	切除不能な局所進行非小細胞肺癌				
適応の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 保険適応あり <input type="checkbox"/> 保険適応なし				
入院実施による算定方法	<input type="checkbox"/> DPC包括対象 <input checked="" type="checkbox"/> DPC包括対象外 (出来高算定) (薬剤師が診療情報士に確認する)				
本治療の位置づけ	進行非小細胞肺癌患者の初回治療として				
使用予定日	2023年 月 日				

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール									
						1日目	8日目	15日目							
治療内容	Rp.1	デキサメタゾン注	6.6mg	30分	点滴	●									
		グラニセトロンバッグ	3mg/100mL												
	Rp.2	生理食塩液	50mL	15分	点滴	●									
	Rp.3	トレメリムマブ	75mg	60分	点滴	●									
		生理食塩液	100mL												
	Rp.4	生理食塩液	50mL	60分	点滴	●									
	Rp.5	デュルバルマブ	1500mg	60分	点滴	●									
		生理食塩液	100mL												
		※体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg													
	Rp.6	生理食塩液	50mL	15分	点滴	●	●	●							
Rp.7	nab-パクリタキセル	100mg/m ²	30分	点滴	●	●	●								
	生理食塩液	投与量による													
Rp.8	生理食塩液	50 mL	15分	点滴	●	●	●								
Rp.9	カルボプラチン	AUC6	90分	点滴	●										
	生理食塩液	500mL													
Rp.10	ソルデム3A輸液	500mL	90分	点滴	●										
総投与時間	約8時間														
血管外漏出時のリスク	カルボプラチンはイリタント(炎症性抗がん剤)、nab-パクリタキセルはピシカント(壊死性抗がん剤)、デュルバルマブとトレメリムマブはノンピシカント(非炎症性抗がん剤)														
(備考)調製時・投与時の注意点など	初回はトレメリムマブを約1時間かけて投与し、その後1時間経過観察する。 (臨床試験において、初回のトレメリムマブ投与後の経過観察は問題がなければ2回目以降省略できるとされていた。呼吸器科医師と相談し、生食投与時間(経過観察時間)は初回で問題なければ15分投与で統一することとなった。) トレメリムマブ、デュルバルマブはインラインフィルターを使用して投与する必要あり。 nab-パクリタキセルはフィルターを使用しないで投与する。														

1サイクル期間	3週間
総コース数	4コースまで繰り返し投与