

| | | | |
|-------------------|---|------|-------|
| 診療科 | 乳腺科 | 管理番号 | 乳腺2-④ |
| レジメン名称 | ハーセプチン単独(3週1回)(1年間) | | |
| 対象疾患・ステージ・適応外の有無等 | 乳癌 | | |
| 本治療の位置づけ | トラスツズマブはHER2陽性再発乳がんにも使用されるが、3週毎の治療法はHER2陽性乳癌術後の中間ないし高リスク群を対象とした術後補助療法で使用される。標準的化学療法後に1年間トラスツズマブを投与するが、長期投与でもあることから心駆出率の低下などに注意が必要である(出現頻度は4年間の追跡で1%未満)。 | | |

| | 投与順 | 薬剤 | 投与量 | 時間 | 投与方法 | 投与スケジュール | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
| 治療内容 | Rp 1 | 生食 | 250mL | 200mL/h 90分 | div | ● | | | | | | | | |
| | | ハーセプチン (トラスツズマブ) | 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg | | | | | | | | | | | |
| | Rp 2 | 生食 | 100mL | | フラッシュ | ● | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1サイクル期間 | 21日間 | | | | | | | | | | | | |
| 総コース数 | 術後補助療法として1年を超える有用性はない(添付文書)。 | | | | | | | | | | | | | |