

| | | | |
|-------------------|---|------|--|
| 診療科 | 消化器内科 | 管理番号 | |
| レジメン名称 | GEM+CDDP +S-1(胆道) | | |
| 対象疾患・ステージ・適応外の有無等 | 胆道癌 | | |
| 本治療の位置づけ | 切除不能胆道癌に対する一次治療の一つとして位置づけられている。GEM単剤と比較し有効性が示されている。 | | |

| | 投与順 | 薬剤 | 投与量 | 時間 | 投与方法 | 投与スケジュール | | | | | | | | |
|---------|--|---------|-----------------------|---------|------|-------------|-----|-----|------|----|----|----|----|--|
| | | | | | | 1日目 | _日目 | _日目 | 15日目 | 日目 | 日目 | 週目 | 週目 | |
| 治療内容 | Rp1 | ソリタT1 | 500mL | 100分 | iv | ● | | | | | | | | |
| | Rp2 | デキサメタゾン | 6.6mg | 30分 | iv | ● | | | | | | | | |
| | | アロキシバック | 50ml | | | | | | | | | | | |
| | Rp3 | シスプラチン | 25mg/m ² | 60分 | iv | ● | | | | | | | | |
| | | 生食 | 250ml | | | | | | | | | | | |
| | Rp4 | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | 30分 | iv | ● | | | | | | | | |
| | | 生食 | 100ml | | | | | | | | | | | |
| | Rp5 | ソルデム3A | 500ml | 100分 | iv | ● | | | | | | | | |
| | Rp6 | ソルデム3A | 500ml | 100分 | iv | ● | | | | | | | | |
| | | S-1 | 80mg/m ² | 分2(朝、夕) | po | day1夕-day8朝 | | | | | | | | |
| | 総投与時間 | 約2時間 | | | | | | | | | | | | |
| | 1サイクル期間 | 2週間 | | | | | | | | | | | | |
| 総コース数 | PDに至るまで | | | | | | | | | | | | | |
| その他特記事項 | S1投与量 BSA<1.25m ² …80mg/day 1.25m ² ≤BSA<1.5m ² …100mg/day BSA≥1.5m ² …120mg/day | | | | | | | | | | | | | |